


Flushing – góð fóðring áðrenn lembing

Seyður skal helst hava hold 3 – 3,5 í brundtíðini (Ranvig, 1998; Robinson *et al.* 2002).

Um seyður er ov illa fyri (< 2) ella ov væl fyri (> 3,5) nyttar onki at økja um fóðurstyrkina (Robinson *et al.* 2002).



Mánaði	Virkssemi
Okt./nov.	Bólka, viga, holdmeta
November	Flushing, fóðring av royndaróm
1. desember	Brundar út
Februar	Skanna allar ærnar
Apríl	Viga/holdmeta royndarær
Mai	Lembing, viga og merkja øll lombini

Viðgerð	A	B	C	D
Fóður	Tað, ið er at bíta i haganum	Tað, ið er at bíta á bønnum	Tað, ið er at bíta á bønnum + seyðafóður	Turt hoyggj úr Íslandi + seyðafóður
Stað	Heygshagi í Kollafirði	Bøurin sunnan fyri Búnaðar- stovuna	Bøurin sunnan fyri Búnaðar- stovuna	Krubba inni á Búnaðarstovuni

Skanning 2011

Einans í tveimum fòrum galið við tal av lombum. Mett 1 lembdi 2.

**Tvílemba: Gult á rygg
Einlemba: Gult á skallan
Geld:**



Úrslit 2011 & 2012

Flushing: Samlað úrslit fyri bæði árin. Skal takast við fyrivarni.

Bólkur	Miðal vekt við byrjan, kg	Miðal hold við byrjan	Broyting í vekt, (Kg)	Broyting í hk	Lambatal
A	54	2,4	1	0,2	1,6
B	54	2,6	-5	0,1	1,5
C	56	2,6	-4	0,2	1,7
D	53	2,6	-5	0,2	1,1